

Antibiótico de amplio espectro más un antiinflamatorio, analgésico, antipirético y mucolítico

FORMULA

Cada ml contiene:

Florfenicol	300 mg
Diclofenaco sódico	20 mg
Bromhexina clorhidrato	10 mg
Vehículo, c.b.p.	1 ml

Reg. SADER Q-0060-092

La venta de este medicamento requiere receta médica. Consulte a su Médico Veterinario.

FORMA FARMACÉUTICA

Solución inyectable

DESCRIPCIÓN

Antibiótico de amplio espectro del grupo de los fenicoles más un expectorante y mucolítico y un potente antiinflamatorio, analgésico y antipirético no esteroide

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Bovinos: Intramuscular, de preferencia en la zona del cuello ó subcutánea.

Porcinos, Ovinos y Caprinos: Intramuscular.

Caninos y Felinos: Intramuscular ó subcutánea

DOSIS

Bovinos: 1 ml por cada 15 kg de peso, se recomienda administrar un total de dos inyecciones con 48 hrs de intervalo (intramuscular) ó 1 ml por cada 7.5 kg de peso como dosis única (subcutánea).

Porcinos, Ovinos y Caprinos: 1 ml por cada 20 kg de peso, se recomienda administrar un total de dos inyecciones con 48 hrs de intervalo.

Caninos y Felinos: 0.084 - 0.16 ml por kg de peso de 3 a 5 días

La dosis y frecuencia puede variar de acuerdo al criterio del Médico Veterinario.

INDICACIONES

Siguiente página

ADVERTENCIAS

Siguiente página

PRECAUCIONES

Siguiente página

PRESENTACIONES

Frasco de 20 ml, 100 ml, 250 ml y 500 ml

USO EN:



al servicio de la Salud Animal



FLOR-DI-BRO

Antibiótico de amplio espectro más un antiinflamatorio, analgésico, antipirético y mucolítico

Reg. SADER Q-0060-092

La venta de este medicamento requiere receta médica. Consulte a su Médico Veterinario.

FORMULA

Cada ml contiene:

Florfenicol	300 mg
Diclofenaco sódico	20 mg
Bromhexina clorhidrato	10 mg
Vehículo, c.b.p.	1 ml

FORMA FARMACEUTICA

Página anterior

DESCRIPCIÓN

Página anterior

INDICACIONES

Flor-Di-Bro contiene en su formulación un antibiótico de amplio espectro del grupo de los fenicoles, un expectorante mucolítico, y un potente antiinflamatorio, analgésico y antipirético no esteroide (no posee los efectos secundarios de los corticoides), lo cual es ideal para el tratamiento sintomático y como coadyuvante en enfermedades bacterianas, agudas o crónicas que cursan con dolor inflamación y fiebre, incluyendo padecimientos broncopulmonares asociados a secreción mucosa anormal y trastorno del transporte mucoso que dificultan la respiración, en bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, caninos y felinos. Posee efectiva distribución plasmática, margen de seguridad y resistencia a la inactivación enzimática bacteriana. No induce aplasia medular

Bovinos: Para tratar problemas respiratorios, mastitis por coliformes, lesiones musculo esqueléticas, queratoconjuntivitis bovina y diarrea.

Porcinos: Indicado para el tratamiento de complejo respiratorio porcino, rinitis, bronquitis, neumonías, bronconeumonías y diarreas, entre otros.

Ovinos y Caprinos: Para tratar el complejo respiratorio en ovinos y caprinos ocasionado por microorganismos susceptibles al florfenicol.

Caninos y Felinos: Para tratar infecciones bacterianas respiratorias y sistémicas susceptibles al florfenicol

ADVERTENCIAS

Puede tornarse la solución de amarillenta clara a amarillenta oscura, sin que esto afecte su potencia terapéutica. No administre a animales hipersensibles a la fórmula. No administre a hembras gestantes o lactantes, ni a equinos. No administrar más de 10 ml en el mismo sitio de inyección. No se deberá consumir la carne de animales tratados con este producto hasta 28 días después de la última aplicación. No administre este producto a bovinos en producción de leche que se destine a consumo humano.

PRECAUCIONES

Evite el contacto con ojos, piel y ropa. Consérvese en lugar fresco y seco

PRESENTACIONES

Frasco de 20 ml, 100 ml, 250 ml y 500 ml

USO EN:



al servicio de la Salud Animal